

ZAHRADNÍKEM v *biozahrádce* – Tabulka vhodných a nevhodných kombinací

Prevenčí proti únavě půdy je pěstování na smíšených záhonech, kde pěstujeme zeleninu zpravidla v řádcích a vedle sebe druhy mělčeji a hluboce kořenící. Rozlišujeme zde hlavní plodinu, která má nejdelší vegetační dobu (např. rajčata nebo košťaloviny). osázení si předem naplánujeme, nesázíme příliš husto, aby se nám rostliny dobře ošetřovaly a také aby si nestínily. Můžeme využít vysetí špenátu pro oddělení záhonů. Špenát pokryje půdu a vytvoří nám cestičky mezi záhony, poslaný špenát potom můžeme zarýt. Cestičky mezi záhony v tomto případě neprohlubujeme.

Na smíšených záhonech můžeme vysít také nějakou aromatickou bylinu nebo květinu, které odpuzují škůdce. Sníženou kulturu můžeme aplikovat na obyčejných záhonech nebo na vyvýšených či ve skleníku.

Dbáme, podle vedlejší tabulky, abychom vedle sebe u, místili plodiny, které se dobře snášejí.

(vha)

[illegible]

Podle: Radomil Hradil a kol.: Česká biozahrada, Fontána, Olomouc 2000

Zahrada v květnu

Milí zahradníci a zahradnice, počásí nám ke konci března a v první polovině dubna přálo, a tak věřím, že jste vše stačili vyset a vysázet, jak jste chtěli a vyrovnali jste tak zpoždění způsobené dlouhotrvajícím nadvládou zimy.

Květen se svým počasím koresponduje s lidskými vlastnostmi. Teplé, slunné počasí s vysušujícími větry se střídá s chladným a deštivým a do toho nám v půli měsíce uhodí ledoví muži, snažící se zhatit naši snahu. Proto v tomto měsíci musíme využít náš cit a předvídatovost, aby nás nic nezaskočilo. Pracovitost a um nám umožní, abychom vše stihli a správně vykonali. Láska pak, aby se nám vše ujalo a zdravě rostlo.

Pokračujeme s postupnými výsevy ředkviček, ředkve (japonské typy), mrkve, řepy salátové, hrachu, mangoldu, tuřinu, vodnici a špenátu do volné půdy. Také vyséváme čekanku salátovou – pukovou, kterou pak v zimě rychlíme na puky, případně hlávkou. Musíme dávat pozor, abychom použili vhod-

ných odrůd pro toto období. To platí i pro ostatní zeleninu. Můžeme vysazovat kedlubny, salát, štěrbák (endivie), pór, brokolici, kapustu (hlávkovou, růžičkovou, kadeřávek), zelí, pekingské zelí a květák.

Přímým výsevem ve vhodném období, aby nám mladé rostlinky nezničili ledoví muži vyséváme na záhony fazole, kukuřici, kopr, okurky (nakládačky, salátovky) a ostatní tykvovitě rostliny. Po odeznění ledových mužů vysazujeme na záhony rajčata, papriky, všechny tykvovitě rostliny (okurky, dýně, cukety, patisony, melouny) a celer.

V pařeniřtích, fóliovnících a ve sklenicích dokončujeme sklizeň rané zeleniny (ředkvičky, salát, kedlubny). Na uvolněné místo vysazujeme papriky, rajčata, okurky, případně ostatní tykvvité rostliny a lilek.

Proti dřepčíkům škodícím na ředkvičkách, ředkvích a ostatní brukvovité zelenině můžeme použít netkanou textilii. Tuto textilií můžeme také použít proti housenkám bělášků a můr škodících na brukvovité zelenině, okurkách (květílka všežravá), cibuli (květílka cibulová), póru (vrtalka pórová) a česneku (houbovníka česneková), mrkve (pochmurnat-

ka mrkvová, případně u brambor (mandelinka bramborová) a jahodníku (květopas jahodníkový). Při použití netkané textilie musí mít rostliny dostatek prostoru pro růst. Dávat pozor, aby se nám pod ní nerozšiřovaly houbové choroby a plísně, musíme tedy větrat. U rostlin potřebujících opylení květů (jahody, okurky) musíme odkrytím zajistit přístup včel. Délka zakrytí rostlin se různí dle doby a délky náletů jednotlivých škůdců, což je odvislé i od průběhu počasí.

Proti mšicím a sviluškám můžeme použít Biool. Proti housenkám Biobit. A uveřejněné rady v části na březen týkající se osevních postupů

V okrasné zahradě vysazujeme převážně po odeznění ledových mužů letničky. Osázení truhlíky a mísy dáváme na své místo. K tomu jen pár rad pro nejčastěji používané truhlíkové okrasné rostliny. Muškáty snášejí plné slunce a jsou geneticky zvyklé na přísušek, proto méně vody je pro ně lepší než přemokření a odvděčí se vám bohatějším kvetením. Surfinie a petúnie potřebují dostatek závlahy a přísušek se jim nelíbí, ale ani přemokření, při kterém rostliny začnou žloutnout.

Ing. Jiří Pospíšilík, Country Life