

JAK VYPADÁ PTAČÍ CHŘIPKA



Dokončení z vedl. strany

Ptačí chřipka – rady ekologickým producentům drůbeže

Zpráva zahrnuje rady ekologickým producentům drůbeže ohledně ptačí chřipky, včetně kroků pro odhad rizika a klíčové symptomy (včetně fotografií znázorňujících infikované ptáky). Ptačí chřipka je nemoc podléhající nutnosti oznámení v případě podezření jejího možného výskytu na farmě místnímu správci státní veterinární služby. Také soukromý veterinář je povinen ohlásit toto podezření.

Ačkoliv nebezpečí přenosu nákazy do UK je nízké, ekologičtí farmáři by měli brát tato opatření velmi vážně, neboť venku je jejich drůbež potenciálně vysoce náchylná k infekci. Nákaza je také specificky významná, protože lidé mohou tuto nemoc dostat při kontaktu s žijícími, nemocnými ptáky. Světová zdravotnická organizace (WHO) však uvádí, že drůbeží produkty nejsou pravděpodobně zdrojem infekce.

Redukce možností nákazy

Podstoupením několika menších změn ve vaší současné farmářské praxi, můžete významně redukovat ohrožení ptačí chřipky. Jako ekologičtí producenti drůbeže jste již předem varováni před nutností extrémní bdělosti nad potenciálním ohrožením a problémy vaší drůbeže, tato přídatná opatření by se neměla zvýšit v rámci rozšíření se již existujícího dohledu a kontroly v praxi. Jsou dvě klíčové oblasti pro okamžitou reakci:

Konstantní přehodnocení možnosti ohrožení nákazou podle následující rady Defra: SA významně doporučuje, že s návazností na následující rady, které berou zřetel na možnost ohrožení lidského zdraví, můžete sdělit odhad možnosti nákazy vašeho hejna. Základní prostředky ekologické ochrany by měly zahrnovat desinfekční nádobu pro očistění obuvi návštěvníků farmy a zajištění potenciální kontaminace výkaly (například, že nebudou vozeny auty).

Příprava plánu pro mimořádné případy vzrůstajícího skutečného ohrožení nákazou:

V případě vzrůstajícího rizika nebo skutečného nakažení ptačí chřipkou v UK, budou státní orgány požadovat, aby všichni ptáci, včetně omezení v rámci zóny do tří kilometrů od místa nakažení, byli izolováni. Tato izolace se bude současně postupně zavádět, co se týče uzavření ptáků.

Nicméně adekvátní související plány jsou na místě, zastřešování ptáků včetně krátkého časového období by mohlo mít značné následky v oblasti welfare zvířat. Farmáři musí být na toto připraveni.

SA současně diskutuje s Defra o této „izolaci“ ptáků, zda-li by nestačilo izolování volných chovů pomocí pokrývání ploch sítěmi, které by zabránily kontaktu divokých ptáků s hospodářskými druhy. Potřeba úplné izolace by měla vzrůstat pouze v případě výskytu vysoce patogenní ptačí chřipky.

Zdroje infekce

Jestliže podstoupíte riziko nakažení ptačí chřipkou, měli by jste věnovat pozornost následujícím potenciálním zdrojům infekce:

□ Vodní toky, jezera, řeky a rybníky či tůň jsou v současnosti významnou potenciální oblastí nákazy, virus je znám přežívat v vodní drůbeže projevující se klinickými symptomy. Virus může také přežívat relativně dobře ve vodě v porovnání s výkaly. Velká hustota populací divokých ptáků samozřejmě nese obrovské riziko. Je důležitý odhad, kde se můžete vy-

hnout kontaktu mezi drůbeží a divokými ptáky v dané oblasti.

□ Návštěvníci – lidé i čtyřnohé druhy – by měli být monitorováni a udržovat s drůbeží minimální kontakt, jakkoliv je to možné.

□ Pokusit se omezit vzájemný přístup hospodářské drůbeže, vodní drůbeže a prasat. Dávat pozor na přímý i nepřímý kontakt. Pamatovat na to, že prasata mohou být hostitelem ptačí chřipky a urychlit její šíření, přičemž ve skutečnosti jí nejsou sami ovlivněni.

□ Sledování změn na populaci divokých ptáků, zvláště bažantů. Jestliže se vyskytnou jejich neobvyklá úmrtnost, je nutné kontaktovat veterinárního lékaře, co nejdříve. Ačkoliv riziko zavlečení stěhovavými ptáky je velmi nízké, výskyt hospodářských zvířat v blízkosti populací divoké vodní drůbeže je v největším nebezpečí možnosti nákazy. Od října Defra pravidelně sleduje stěhovavou i sídlící divokou vodní drůbež. Ornitologové mají vytyčeno pod neustálým dohledem pět nebo šest hlavních oblastí. Defra bude také vyšetřovat úhyny divokých ptáků a uvítá veškeré informace případného výskytu.

Veterináři a Defra mohou poskytnout další rady a asistenci a provést odhad možného rizika, co se týče lidského zdraví. Pomoci může také místní ornitologický spolek nebo spolek na ochranu ptáků.

SA bude krátce poskytovat více informací o vzdušných cestách stěhovavých ptáků.

Symptomy

SA věří, že nebezpečí nákazy ptačí chřipky v UK je v současnosti nízké a doufá, že producenti nepřijdou do styku s infikovanými ptáky, je však významné být si vědom a znát případné symptomy nemoci. Ptáci mohou vykazovat širokou skupinu symptomů, v případě, že jsou infikováni ptačí chřipkou. Často také mohou však uhynout, aniž by příznaky nemoci byly znatelné. Všeobecně platí, že náhlý úhyn s vysokou úmrtností, navenek s neprojevenými příznaky, by měl vzbudit pozornost u všech producentů. Jestliže máte jakékoli podezření na neobvyklou drůbeží nemoc, měli by jste kontaktovat vašeho veterináře tak, aby mohlo být zahájeno laboratorní vyšetření, co nejdříve.

Ostatní symptomy ptačí chřipky:

- Snížení spotřeby krmiv
- Přestávka ve snášce vajec, poslední snesené vejce při počátku nákazy je většinou bez skořápky
- Otok (nádor) na hlavě, krku a kolem očí
- Cyanóza hřebínku a laloků (modré zabarvení plynoucí z nepravděpodobné cirkulace krve)
- Plazmové nebo krvavé puchýřky na povrchu hřebínku s tečkovanými krevními podlitinami
- Skleslost a nechů k jídlu



□ Průjem, který začíná jako vodnatý světle zelený a pokračuje do téměř úplně bílého zbarvení

□ Značná deprese

□ Rozcuchané peří

□ Nadměrná žízeň

□ Rozptýlené krevní podlitiny na končetinách mezi béráky a koleny



Smrt by měla nastat do 24 hodin od prvních příznaků nemoci, většinou však do 48 hodin nebo může mít zpoždění do jednoho týdne. Některé z mála infikovaných slepic se mohou znovu uzdravit.

U brojlerů, jsou příznaky nemoci často méně zřejmé. Prudká deprese, nechů k jídlu a značný nárůst v úhynu jsou obvykle prvními projevy abnormalit. Mohou být také patrné otoky na hlavě, krku a neurologické příznaky, jako jsou strnutí šije a ataxie.

Průběh nemoci u krůt je podobný avšak trvá o dva až tři dny déle a příležitostně je doprovázen zduřelými dutinami. U domácích kačen a hus jsou příznaky deprese, nechů k jídlu a průjem podobné jako u ostatních avšak často se zduřelými dutinami. Mladší ptáci mohou být vystaveni neurologickým symptomům.

PTAČÍ CHŘIPKA A EU

Komisař pro ochranu zdraví spotřebitele **Markos Kyprianou** reagoval na poslední situaci týkající se výskytu nových případů nakažené drůbeže v Chorvatsku, v Rusku, importovaného papouška v UK, nízkou patogenického druhu ve Švédsku a potvrdil zákaz Komise importovat veškerou drůbež, pernatou zvěř a opeřence z Chorvatska, což má být formálně zavedeno v EU (SCoFAH). Ve světle události v UK, většina Ministrů přijala návrh Komise, že by měl platit dočasný zákaz v importu odchycených ptáků pro komerční účely do EU. Účel těchto návrhů byl předmětem setkání SCoFAH. Kyprianou také kladl důraz, že případ v UK zahrnoval karanténní systém a proto UK i nadále zůstává osvobozena od této nemoci. Někteří delegáti (Francie, Itálie, Maďarsko) se chopili příležitosti poukázat, jak současné mediální působení zapříčinilo pokles v obchodních cenách a odbytu a navrhuje, aby EU dělala více na adresu těchto ekonomických důsledků. V první odpovědi Komise podtrhla, že současná situace je otázkou zdraví zvířat, která nesouvisí s bezpečností potravin a současně obchodní problémy by neměly znamenat více než krátkodobý fenomén. **Fischer Boel** uvedla, že návraty nákladů z exportu jsou hlavním nástrojem pro podporu obchodu a toto Komise monitoruje velmi pozorně. Nicméně, potvrdila, že existují možnosti dotované finanční podporou EU v rámci události spojené s šířením ptačí chřipky – v oblastech, kde je požadována porážka. Otázka, zda vejce z volných chovů nebo bioprodukce budou bez dlouhodobějšího označení z důvodu opatření týkající se výskytu ptačí chřipky nebyly diskutovány.

Předsednictví shrnulo debatu se zaměřením pozornosti na nová finální pravidla pro kontrolu ptačí chřipky při příležitosti prosincového zasedání Rady, jakmile vyjádří Evropský parlament svůj názor. Tento záměr byl však předsednictvím uveden již dlouho před rozšířením nákazy v Turecku a Rumunsku.

Více informací:

Následující webové stránky poskytují užitečné rady a informace o ptačí chřipce, co se týče zdraví drůbeže a lidského zdraví (v angličtině): www.soilassociation.org – www.soilassociation.org/birdflu – www.defra.gov.uk

Přeložila
Ing. Vladimíra ČERVENÁ, PRO-BIO